



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE

(Modelo de laudo estruturado para relatório de leiomiomas uterinos)

TÉCNICA

Exame realizado pelas técnicas TSE e GRE com imagens multiplanares ponderadas em T1 e T2 antes e após a administração intravenosa de meio de contraste paramagnético (gadolínio).

#####Utilizado gel para distensão do canal vaginal.

ANÁLISE

Útero: () anteversoflexão. () medianizado. () retrovertido.

Medidas uterinas: __ x __ x __ cm. Volume: _____ cm³.

Endométrio: () homogêneo () heterogêneo () mal definido

Espessura do endométrio: _____ cm.

Zona juncional: espessura de __cm.

() com espessamento focal

() com espessamento focal e microcistos

Miomas:

Número de miomas: (nenhum/ especificar entre 1-10/ >10/ múltiplos).

Realce dos miomas: () ausente. () homogêneo. () heterogêneo.

Os três maiores miomas são:

	Localização	Tamanho (cm)	Tipo	Realce
Nódulo 1				
Nódulo 2				
Nódulo 3				

Miomas submucosos: () Sim. () Não.

Se sim:

	Localização	Tamanho (cm)	Manto externo (cm)
Nódulo 1			
Nódulo 2			

Miomas cervicais ou cornuais: () Sim. () Não.

Suprimento vascular uterino: () artérias uterinas () artérias uterinas e ovarianas.

Ovários:

Ovários com dimensões preservados, com atividade folicular normal.

Ausência de líquido livre na pelve.

Referências:

- Structured vs narrative reporting of pelvic MRI for fibroids: clarity and impact on treatment planning. *European Radiology* (2018) 28:3009–3017.
- <http://www.radreport.org/template/0000259>