



LAUDO ESTRUTURADO ENTEROGRAFIA POR RM

Técnica: Exame realizado com sequências FSE e GRE, ponderadas em T1 e T2, antes e após a administração intravenosa do meio de contraste paramagnético (gadólíneo). Realizada protocolo dirigido para enterorressonância com uso de Muvinlax® oral.

Antecedentes clínicos:

Motivo do exame _____

Cirurgias prévias () não () sim, qual? _____

Análise

1) Atividade inflamatória

| | Não | Sim | Local | Extensão | Comentário |
|------------------------|-----|-----|-------|----------|------------|
| Hiperrealce mural | | | | | |
| Espessamento da parede | | | | | |
| Ulceração | | | | | |
| Edema (T2) | | | | | |
| Restrição à difusão | | | | | |

2) Doença estenosante Ausente () Presente ()

Se presente, Local da estenose, _____

3) Doença penetrante

| | Não | Sim | Comentário |
|------------|-----|-----|------------|
| Perfuração | | | |
| Fístula | | | |
| Abcesso | | | |

4) Achados mesentéricos

| | Não | Sim | Comentário |
|--|-----|-----|------------|
| Edema perientérica | | | |
| Ingurgitamento vascular (sinal do pente) | | | |
| Proliferação gordurosa | | | |
| Trombose;oclusão venosa mesentérica | | | |
| Adenopatia (>1,5 cm) | | | |

7) Achados extra-intestinais

| | Não | Sim | Comentário |
|---------------------------------|-----|-----|------------|
| Sacroileíte | | | |
| Colangite esclerosante primária | | | |
| Colelitíase. | | | |
| Nefrolitíase. | | | |
| Necrose avascular | | | |

8) Outros achados

9) Análise comparativa

10) Opinião